



รายการยาเม็ดรับประทานที่ห้ามบด ห้ามเคี้ยว

คณะกรรมการพัฒนาระบบยา โรงพยาบาลขอนแก่น

รายการยาห้ามบด ในโรงพยาบาลขอนแก่น



รายการยา	ชื่อการค้า	Product
Alendronate Sodium	Fosamax®	1A
Alfuzosin	Xatral XL®	2A
Amoxicillin/ Potassium clavulanic	Amoksiklav® Ranclav®	ยาจะ เหนียวเมื่อ บด
Aspirin gr 300 mg		1A
Azathioprine	Imuran®	6
Bisacodyl	Dulcolax®	1A
Capecitabine	Xeloda®	6
Carbamazepine	Tegretol CR®	1B
Ciprofloxacin		4
Cyclophosphamide	Endoxan®	6
Dexamethasone		6
Diclofenac	Voltaren®	1A
Diltiazem HCl	Herbesser R 100®	2A
Doxycycline	Vibramycin®	5
Enalapril	Renitec®	ยาจะ เหนียวเมื่อ บด
Erythromycin		1A
Felodipine	Plendil®	2A
Ferrous fumarate		1A
Finasteride	Proscar®	6
Fluoxetine	Prozac-20®	2A
Hydroxyurea	Hydrea®	6
Indinavir	Crixivan®	2C, 4
Isosorbide dinitrate	Isordil® sublingual	3
Isosorbide-5-mononitrate	Imdur®	2A
Lansoprazole	Prevacid FDT®	1B,1C
Melphalan	Alkeran®	6

รายการยา	ชื่อการค้า	Product Informat
Mercaptopurine	6-MP®	6
Methotrexate	MTX®	6
Morphine continuous	MST®	2A
Omeprazole	Losec®	1B
Orphenadrine citrate	Norflex®	2B
Penicillin V		4
Pentoxifylline	Trental®	2B
Phenytoin	Dilantin®	2D
Piroxicam	Feldene®	5
Praziquantel		4
Pyridostigmine	Mestinon®	2A
Quinine		4, 5
Rowatinex	Rowatinex®	1A
Serratopeptidase	Danzen®	1B
Sodium valproate	Depakine ®	1A
Sulfasalazine	Salazopyrin®	,2A
Tamoxifen		6
Tamsulosin	Harnal®	1A
Testosterone	Andriol®	เจาะได้
Tetracycline		4
Theophylline	Theo-dur®	2B
Thioguanine	6-TG®	6
Tolterodine	Detrusitol®	2A
Topiramate	Topamax®	4
Trimetazidine	Vastarel-MR®	2A

**หมายเหตุ

1A ยาเม็ดเคลือบเพื่อให้แตกตัวในลำไส้ เนื่องจากตัวยามีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อเมือกกระเพาะอาหาร

1B ยาเคลือบเพื่อให้แตกตัวในลำไส้ เนื่องจากตัวยาไม่ทนต่อน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร

1C ยาเคลือบเพื่อให้แตกตัวในลำไส้ อาจถอดเปลือกแคปซูลออกหรือละลายเมื่อยากับเครื่องดื่ม เช่น น้ำแอปเปิ้ล โดยไม่มีการบด

2A ยาเม็ดออกฤทธิ์เน้นที่ไม่ควรบด หัก หรือ เคี้ยว

2B ยาเม็ดออกฤทธิ์เน้นที่ไม่ควรบดหรือ เคี้ยว แต่อาจหักครึ่งได้

2C ยาแคปซูลออกฤทธิ์เน้นที่ไม่ควรบดเคี้ยว แต่อาจถอดเปลือกออกแล้วผสมยาที่อยู่ในกับเครื่องดื่ม หรืออาหาร โดยไม่มีการบดหรือเคี้ยว

2D ยาแคปซูลออกฤทธิ์เน้นที่ไม่ควรบด เคี้ยว หรือถอดเปลือกแคปซูลออก

3 ยามอมใต้ลิ้น ถูกออกแบบให้แตกตัวละลายได้อย่างรวดเร็วในช่องปากและดูดซึมอย่างรวดเร็วทางเส้นเลือดฝอย

4 Bitter taste or Bad taste

5 ยามีคุณสมบัติระคายเคืองกระเพาะอาหาร, เยื่อช่องปาก

6 ยาที่หักบดต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากยามีฤทธิ์เป็น Carcinogen/Teratogen/Cytotoxic

7 ...ain teeth if crushed and permanent teeth discoloration may occur.



งานเภสัชกรรมบริการสารสนเทศ 1318
update : สิงหาคม 2554