



กรมการแพทย์
กรมการแพทย์

โรงพยาบาลขอนแก่น		หน้า : 1/1
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ : KKH-8ก-190		ฉบับที่ : ก
เรื่อง : การดำเนินการเมื่อพบผู้ป่วยเกิดปฏิกิริยาจากการรับเลือดหรือส่วนประกอบเลือด (transfusion reaction)		วันที่ : 8 มกราคม 2567
แผนก : คณะกรรมการด้านความปลอดภัย เรื่อง การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด	แผนกที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงาน	
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการด้านความปลอดภัย เรื่อง การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด	ผู้อนุมัติ : (นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น	

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางในการประสานงานกับคลังเลือดเมื่อพบผู้ป่วยเกิดปฏิกิริยาจากการรับเลือดหรือส่วนประกอบเลือด (transfusion reaction) และสามารถสรุปสาเหตุของปฏิกิริยา เป็นประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันต่อไป

นโยบาย : สามารถแก้ไขผู้อาการที่ป่วยเกิดปฏิกิริยาจากการรับเลือดหรือส่วนประกอบเลือด (transfusion reaction) รวมทั้งป้องกันการเกิดซ้ำ

วิธีปฏิบัติ :

1. ในรายที่มีปฏิกิริยาจากการให้เลือดรุนแรง พยาบาลวิชาชีพแจ้งเจ้าหน้าที่คลังเลือด และเจาะเลือดที่แขนด้านตรงข้ามกับแขนที่ให้เลือดใส่ EDTA tube ติด sticker ชื่อ สกุลผู้ป่วยให้ถูกต้อง
2. บันทึกจำนวนเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดที่ให้ผู้ป่วย วันเดือนปี เวลาที่เกิดอาการและอาการแสดงใน BBIS-web ordering
3. นำ tube เลือดและถุงเลือดที่ถอดออกจากผู้ป่วยใส่ในภาชนะนำส่งคลังเลือดทันที
4. พยาบาลวิชาชีพผู้ให้เลือดบันทึกอาการและอาการแสดง ให้ครอบคลุมตั้งแต่ ก่อนให้เลือด ขณะให้เลือดและหลังให้เลือด ในแบบฟอร์ม Nurse's note และรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตามแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง